

Trattamento antielmintico ovvero come ti ammazzo il vermone

- ☉ Cambiare le mutandine (questo lo si fa sempre), ma anche il pigiama e il lenzuolo tutti i giorni per 15-20 giorni; basta anche passare su questi indumenti e sul lenzuolo un ferro da stiro molto caldo (alcune uova, depositate nelle pieghe dell'ano, possono cadere sul lenzuolo, ma anche alcuni ossiuri si possono trovare sul lenzuolo).
- ☉ Usare asciugamani strettamente personali.
- ☉ Lavare a fondo gli impianti igienici e sterilizzarli con i comuni disinfettanti.
- ☉ Curare particolarmente l'igiene personale e soprattutto le mani, le parti intime, i capelli, le pieghe interne delle orecchie.
- ☉ Tagliare le unghie a zero e pulirle con il bruschino già qualche giorno prima e poi nei primi giorni dalla somministrazione del farmaco.
- ☉ Evitare di ingerire ortaggi crudi e frutta non sbucciata.
- ☉ Evitare di ingerire carni, crostacei e frutti di mare, se non ben cotti.
- ☉ Evitare di bere acqua della cui purezza non si è sicuri.
- ☉ Evitare che il bambino vada a dormire nel letto di fratelli e meglio anche dei genitori
- ☉ Infine, se le infestazioni si ripetono dopo il trattamento farmacologico, domandare se nella classe ci sono altri bambini con ossiuri.

Trattamento farmacologico

- ☉ Somministrare **Vermox**:
Sospensione (20 mg/ml; misurino tarato a 2.5-5-10 ml); Compresse 100 mg
 - 5 ml del misurino o 1 cpr. in una sola somministrazione, indipendentemente dai pasti, **da eseguirsi da parte di tutto il nucleo familiare** (compresi mamma e papà).
- ☉ Un'altra somministrazione va ripetuta dopo 15 giorni.

